


Дорога подруго!
Потрать кілька хвилин, щоб дізнатись, що
таке злоякісна пухлина яєчників
ТВОЯ ПОІНФОРМОВАНІСТЬ

є основою для
встановлення своєчасного діагнозу.



Перш за все, чи знаєш ти, що таке яєчники?

Яєчники являють собою два органи величиною біля трьох сантиметрів в діаметрі кожен і розміщені вони один зліва, інший справа від матки, з якою вони сполучені матковими трубами. Яєчники виробляють жіночі статеві гормони і яйцеклітини, що являються жіночими продуктивними клітинами.

Що являє собою рак яєчників?

Рак яєчників розвивається, коли починається неправильний ріст і поділ клітин. Причини неправильного поділу клітини до сьогодні не досить вивчені.

Наскільки поширене це захворювання?

В Італії серед чотирьох видів онкозахворювань, які найчастіше зустрічаються у жінок, щороку нараховується біля 5000 нововиявлених діагнозів. Найбільш поширене це захворювання серед населення кавказької національності, в країнах північно-західної Європи і в Сполучених Штатах Америки. Менше зустрічається в азіатських і в південно-американських країнах. В Європі складає 5% серед усіх онкозахворювань у жінок.

Які фактори ризику?

- Вік. У більшості випадків виявляється після початку менопаузи у віці 50-69 років.
- - Безпліддя.
- - Перші менструації в ранньому віці.
- - Пізня менопауза.
- - відсутній прийом гормональних контрацептивів.
- - Випадки - більше 2-х або 3-х - захворювань на рак яєчників або молочних залоз у сім'ї.
- - жінки, які вже мають ендометріоз.

Що важливо знати?

Рак яєчників є чи не найпідступнішим із всіх видів онкозахворювань і ніяк не проявляється в організмі жінки, доки пухлина не досягне значних розмірів. Симптоми є загальними і їх легко сплутати з симптомами інших соматичних захворювань. Отже, тебе має насторожити той факт, якщо навіть незначні болі внизу живота є постійними протягом 15-ти днів у місяці і це триває протягом 2-х чи 3-х місяців. Це може бути сигналом для звернення до лікаря.

Перші небезпечні симптоми.

- здуття живота
- часті позиви до сечовиділення
- часті розлади травлення у вигляді закрепів
- відчуття повноти при порожньому шлунку
- кров'яністі виділення із статевих органів
- загальна слабкість

Загальні симптоми

Якщо ці симптоми поєднані або проявляються несподівано, ти маєш бити тривогу, тобто повідомити свого сімейного лікаря чи гінеколога.

Діагностичні обстеження

Твій сімейний лікар зможе тебе вислухати і оглянути і правильно оцінити ситуацію чи направити тебе до гінеколога, який забезпечить слідуючі діагностичні обстеження

- огляд гінеколога
- УЗД з трансвагінальним дослідженням
- онкомаркер
- магніто-резонансну томографію-MPT та комп'ютерну томографію-КТ

Лікування

Жінки, що потерпають від злоякісної пухлини яєчників, можуть бути прооперовані навіть на другій стадії хвороби.

Тепер ти знаєш, що

жінки, хворі на рак яєчників, в часті помирають тому, що не звертаються до лікарів і діагноз встановлюється занадто пізно

Єдиний спосіб запобігти захворюванню

Щорічний регулярний огляд у лікаря-гінеколога з проведенням УЗД (включаючи трансвагінальне) дослідження. Твій гінеколог визначить, з якою періодичністю оглядатися.

Найкраще, що ти можеш для себе зробити

довірити ся компетентним і досвідченим спеціалістам.

ВСІ ЦІ МОТИВИ ВКАЗУЮТЬ НА НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛЮ ЗА ВЛАСНИМ ЗДОРОВ'ЯМ.